

FERTILIZANTE QUÍMICO-ORGÁNICO COMPLEJO FOLIAR

# ASTARTE K

LÍQUIDO

**Contenido de nutrientes**

Nitrógeno total (N).....	0.3%
Potasio soluble (K).....	18.8%
Aminoácidos libres.....	0.05%
Aminoácidos totales.....	1.7%
Materia orgánica (t/c).....	21-23%
Cenizas (t/c).....	33-35%

**Grado: 0.3-0-18.8**

**Grado Equivalente: 0.3-0-22.5**

pH: 6,4      Densidad: 1,39 g/ml      Tensión superficial: 68,3 dyn/cm

SENASA nro.: 18.355

Origen: Argentina

Fecha de fabricación:

**Recomendaciones de uso**

**ASTARTE K** es un fertilizante foliar que recomendado para mejorar las condiciones nutricionales los cultivos. Ayuda a paliar los déficits de potasio, juega un papel fundamental en la síntesis y acumulación de hidratos de carbono y proteínas. Y, además, influye en la tolerancia al frío y el desempeño ante un eventual stress hídrico. Impactando en positivamente en la calidad de los frutos.

Para su correcta aplicación se deben respetar las siguientes indicaciones.

1. Agregar agua al tanque del pulverizador hasta la mitad de su capacidad.
2. Encender el agitador.
3. Medir la dosis indicada e incorporarla al tanque. La dosis podrá variar de acuerdo a la zona, suelo y cultivo.
4. Complete con agua el resto del tanque.

El producto preparado no debe conservarse por más de 24 horas en el tanque de la pulverizadora.

**Especificidad en cultivos y dosis recomendadas.**

Cultivo	Dosis	Momento de aplicación
Hortícolas de fruto	900 - 1200 cm <sup>3</sup> /hl	Desde inicio de brotación, realizar de 3-4 aplicaciones. Utilizar las dosis más elevadas en casos donde se detecten deficiencias marcadas.
Frutilla	900 - 1200 cm <sup>3</sup> /hl	Desde inicio de brotación, realizar de 3-4 aplicaciones.
Arándano	500 – 700 cm <sup>3</sup> /hl	Aplicar desde floración cada 15 días, hasta 15 días antes de la cosecha. No aplicar más de 3 veces.
Frutales de pepita y carozo	250 - 650 cm <sup>3</sup> /hl	Desde brotación, aplicar entre 2-3 veces.
Cítricos	250 - 650 cm <sup>3</sup> /hl	Aplicar antes de la floración, caída de pétalos y en otoño. Repetir cada 20 á 30 días.

**"ESTE PRODUCTO ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LOS FERTILIZANTES DE APLICACION COMUN (INCORPORADOS AL SUELO)"**

**"NO PULVERIZAR EN ÉPOCA DE GRAN TEMPERATURA O DE ALTA INSOLACIÓN"  
"UTILIZAR UN TENSIOACTIVO NO IONICO NO POLAR (0,5-1%)"**

**Incompatibilidad:** Este producto es compatible con los productos normalmente utilizados en los cultivos para lo que se recomienda su uso. No obstante, antes de realizar la mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a escala para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes, así como la posible fitotoxicidad para los cultivos.

**Condiciones de almacenamiento:** Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seguro, fresco, seco y al resguardo de la luz solar, ubicado fuera del alcance de personas inexpertas y animales. No transportar ni almacenar con alimentos, plaguicidas y semillas. Evitar almacenar a temperaturas por encima de 35 °C.

**Firma registrante:** Microvidas S.R.L. domiciliada en Huergo 1285 – Santa Fé – Email: [rmonella@microvidas.com.ar](mailto:rmonella@microvidas.com.ar)

**Información general:** **ASTARTE K** juega un rol importante en la síntesis de proteínas y de almidón de las plantas; Interviene en la activación de diferentes enzimas relacionadas con el crecimiento y desarrollo de la planta. Su aplicación de forma foliar ayuda a paliar los posibles déficits de potasio en el suelo o ayuda a sobrepasar de mejor manera distintos tipos de estrés que las plantas normalmente sufren durante el desarrollo de los cultivos.

